

Descrizione di tre nuove specie di uccelli raccolte nei Monti Carin da LEONARDO FEA.

Per T. SALVADORI.

Suthora Feae, nov. sp.

Pileo, cervice et supracaudalibus nitide ruso-ochraceis, dorso olivaceo-ruso; fascia superciliari postice producta nigra; loris albidis, macula anteoculari fusca; taenia supraoculari postice producta et plumis subocularibus ruso-ochraceis; genis et regione malari, plumis elongatis obsita, albis; gula nigerrima; plumis auricularibus, lateribus colli et collo imo antico cinereis, hoc pallidiore; abdome medio albido; lateribus, subcaudalibus et tibiis rufescente-ochraceis; tectricibus alarum olivaceo-rufis, dorso concoloribus, tectricibus remigum primiarum nigris; remigibus fuscis, primis exterius albo limbatis, reliquis nitide ruso-ochraceo marginatis; remigibus ultimis dorso proximis fusco-griseis, remigibus omnibus intus albo marginatis; subalaribus albis; cauda ruso-ochracea, apice grisecente; maxilla fusca, mandibula pallida; pedibus corneis.

Long. tot. 0^m,110; al 0^m,045; caud. 0^m,053; rostri 0^m,007; tarsi 0^m,020.

Obs. *Suthora S. MUNIPURENSI* Godw.-Aust. et Wald. *similis*, sed *taenia supraoculari rufa, minime alba, regione suboculari postica minime alba et ruso marginata, lateribus et subcaudalibus laete rufescentibus facile distinguenda.*

Malacias castanopterus, nov. sp.

Malacias M. MELANOLEUCO (Tick.) similis, sed major et tectricibus majoribus ultimis, remigibusque tribus ultimis dorso proximis castaneis, nigro marginatis, et gastraeo toto albo pallide ochraceo tineto, diversus.

Pileo, cervice, lateribus capitis et mento nitide nigris, dorso toto, scapularibus, uropygio et supracaudalibus saturate brunneis; alis nigris, exterius viridi nitentibus; remigibus tribus ultimis,

tectricibusque majoribus ultimis, dorso proximis castaneis, nigro marginatis; remigibus intus basin versus late albis; cauda fusco-nigra, rectricum apicibus late albo-griseis, maculis albis rectricum interiorum sensim minoribus; gastraeo toto albo, paulum ochraceo tincto, gula pure alba.

Long. tot. 0^m,138-0^m,130; al 0^m,096; caud. 0^m,110-0^m,100; rostri 0^m,017; tarsi 0^m,030.

Poliopsar fuscogularis, nov. sp.

Capite et collo sordide cinereis, capitis plumis longissimis et tenuissimis; mento et gula summa fusco-nigricantibus; dorso, scapularibus, uropygio et supracaudalibus saturate cinereis, uropygio paullo pallidiore; pectore et lateribus vinaceis, his parte ima griseentibus, abdomine medio et subcaudalibus sordide albis, tibias griseis; remigibus primariis nigris, in parte basali albis; remigibus secundariis et tectricibus majoribus brunneo-sericeis, nigro limbatis; tectricibus alarum mediis et minoribus paullo obscurioribus; tectricibus remigum primiarum albis, fusco variis; subalaribus sordide albis; cauda nigra, rectricibus duabus mediis brunneo-sericeis, reliquis apice late albis; rostro in exuvie rubro-aurantiaco, basi mandibulae fusca; pedibus fusco-aurantiacis.

Long. tot. circa 0^m,232; al 0^m,117; caud. 0^m,079; rostri culm. 0^m,023; tarsi 0^m,034.

Questa specie somiglia al *P. burmanicus* (Jerd.), ma ne differisce per il becco più lungo e per la grande macchia nera sul mento e sulla parte superiore della gola; inoltre le piume della testa lunghissime ed asfilate e quelle del collo sono di color grigio lurido, il colore grigio del dorso è più scuro ed il colore vinaceo del petto è pure più oscuro.